果菜類	育苗期	本葉展開時800～1,000倍 一週間後に計2回
	仮植期	週に一回の葉面300～500倍 計2～3回
	定植後～ 成育最盛期	週に一回の葉面200～300倍適時に 月2回の流し込み4～5Ｌ10a当り1回分の量 (農薬使用時混合散布OK)
葉茎菜類	育苗期	本葉展開時800～1,000倍 一週間後に計2回
	定植後～ 成育最盛期	週一回の葉面500～800倍適時に (農薬使用時混合散布OK)
根菜類	生育期間 生育最盛期	本葉2～3枚展開時500～800倍適時に 月2回の葉面300～500倍適時に (農薬使用時混合散布OK)
花卉	育苗期 定植後生育最盛期	活着後週1回葉面500～800倍適時 葉や茎を固くし、耐病性強化300～500倍適時に
果樹類	萌芽期 (つぼみ固い)	開花を促す為800～1,000倍 1回
	落花後～ 栄養成長期	10日に1回の葉面300～500倍適時に 葉を固くし、耐病性を強化 農薬使用時忘れず混合 適時に
	収穫20日前 収穫まで	週1回の葉面300～500倍3回 収穫前日まで 単体使用ＯＫ
	収穫後～ 落葉まで	月2回の葉面300倍 葉や枝を固くし、耐病性強化
水稲	緑化開始時～ 田植えまで	稲育苗は週1回灌水時に300倍 プール育苗は当初水量に300倍液流し込み 水の追加時に追加流し込み (育苗中ケイ酸をしっかり吸収させる)
	幼穂形成時～ 出穂20日前まで	水口より10ａ当り10Ｌを流し込む (ケイ酸補給でモミの肥大倒伏防止)