酸素のチカラで品質アップ

酸素供給剤

ネオカルオキソ　ネハリエース　M.O.X　M.O.Xゴールド　オキシグリーン




こんな畑にオススメです

・水が溜まり易い　・堆肥を大量に使う
・硬く締まり易い　・気象条件が過酷

★なり疲れ対策　収量・品質向上

実を多くつけた生育後期のイチゴは
根の活性が衰え、**なり疲れ**状態となります。
「酸素供給剤」は根の回りに酸素を
供給する事で肥料の吸収能力を向上させ、
なり疲れ対策や収量・品質向上を図ります。
排水の悪い圃場や硬く締まった圃場の
酸欠対策にお役立ていただけます。

酸素が不足すると肥料吸収力低下



（引用元：位田氏1956年）

★健苗育成

苗の根に酸素を供給する事で、発根を促成させて根張りを良好にします。
また、土壌を好気的環境にすることで、嫌気性菌の蔓延を防ぎ、苗を守ります。
酸素供給剤を**健苗育成**にお役立て下さい。

製品ラインアップ

★粒剤「過酸化カルシウム」＋土壌中の水分→酸素＋消石灰

・ネオカルオキソ：元肥型　効果３ヵ月　pH:11-12

・ネハリエース　：追肥型　効果１ヵ月　pH:11-12

★液剤「過酸化水素」＋土壌中の金属分・有機物→酸素＋水

・M.O.X　：速攻性　1日で全量放出　pH:4.5　※M.O.Xは100倍以上希釈で中性

・M.O.Xゴールド　：速攻性　M.O.X＋木酢液　pH:3.5

・オキシグリーン：速攻性　M.O.X＋有機酸　pH:1.1

※液剤使用上の注意事項

強アルカリ薬剤、銅剤、鉄剤との混用や高温時や日差しが強い時間帯の散布を避ける。オキシグリーンは他剤と混用不可。

詳しくは

HODOGAYA CHEMICAL

使用方法

ネオカルオキソ

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
畝立て時	土壌混和	40~60kg/10a	根張り増進 根腐れ・根傷み予防

ネハリエース

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
畝立て後	潅水チューブ下に スジ状に施用	20kg/10a	根張り増進 根腐れ・根傷み予防
過湿時	過湿箇所の畝間散粒	20~30kg/10a	酸欠状態の改善

M.O.X　M.O.Xゴールド

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
育苗時	潅水（1回/週）	100倍希釈液	健苗育成
定植時	苗をドブ漬けまたは 潅水	100倍希釈液	活着促進
開花後	潅水（14日間隔） （低温期：10日間隔）	100倍希釈液 1000L/10a	養水分の吸収力向上 なり疲れ対策

オキシグリーン

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
根傷み 株疲れ時	株間潅注	200倍希釈液 1L/1株	根張り増進、根傷み予防 リン酸の肥効向上

取扱い店：

製造元：保土谷化学工業株式会社
東京都港区東新橋1-9-2
お問い合わせ：03-6852-0386