酸素のチカラで根張りを向上

酸素供給剤

ネオカルオキソ　ネハリエース　M.O.X　M.O.Xゴールド　オキシグリーン




こんな畑にオススメです

- 水が溜まり易い
- 堆肥を大量に使う
- 硬く締まり易い
- 気象条件が過酷

★品質向上

土壌中の酸素濃度が低下すると
養水分の吸収能力も低下します。
特に**ネギは酸素要求量が多い**作物です。
土壌に酸素を供給し、高品質な
ネギの収穫を狙いましょう。
硬く締まってしまう土壌等、
酸欠状態に陥り易い圃場に最適です。

酸素が不足すると肥料吸収力低下



★湿害対策

圃場に水が滞留すると土壌中の酸素濃度が低下し
根が酸欠状態に陥り、根腐れ（湿害）が発生します。
酸素供給剤を降雨前後に施用する事で、根の呼吸を助け、**湿害を軽減**させます。
排水性の悪い圃場等、**水が溜まり易い圃場の湿害対策**に最適です。

製品ラインアップ

★粒剤「過酸化カルシウム」＋土壌中の水分→酸素＋消石灰
- ネオカルオキソ：元肥型　効果３ヵ月　pH:11-12
- ネハリエース　：追肥型　効果１ヵ月　pH:11-12

★液剤「過酸化水素」＋土壌中の金属分・有機物→酸素＋水
- M.O.X　：速攻性　1日で全量放出　pH:4.5　※M.O.X は100倍以上希釈で中性
- M.O.Xゴールド　：速攻性　M.O.X＋木酢液　pH:3.5
- オキシグリーン：速攻性　M.O.X＋有機酸　pH:1.1

※液剤使用上の注意事項
強アルカリ薬剤、銅剤、鉄剤との混用や高温時や
日差しが強い時間帯の散布を避ける。オキシグリーンは他剤と混用不可。

詳しくは

HODOGAYA CHEMICAL

使用方法

ネオカルオキソ

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
定植前	全面散粒し、すき込む	定植前：40~60kg/10a （畝施用時：半量）	根張り増進 根傷み・根腐れ（湿害）予防
土寄せ時	すじまき	20~30kg/10a	
定植時	植溝にすじまき	10kg/10a	初期成育・活着促進、湿害予防

ネハリエース

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
降雨前後	表面散粒	20~30kg/10a	湿害の予防、回復

M.O.X　M.O.Xゴールド

施用時期	施用方法	施用量	効果
降雨後	株元潅注 （2~5日間隔で2~3回）	50倍希釈液	冠水被害後の早期回復

オキシグリーン

施用時期	施用方法	施用量	ねらい
根痛み 株疲れ時	株元潅注	300倍希釈液 1000L/10a	根張り増進、根傷み予防 リン酸の肥効向上

取扱い店：

製造元：保土谷化学工業株式会社
東京都港区東新橋1-9-2
お問い合わせ：03-6852-0386